

SOFARGEN[®] Spray

Spray do stosowania na skórę

10 g proszku w sprayu zawiera kaolin lekki i sulfadiazynę srebra



OPIS PRODUKTU:

SOFARGEN[®]Spray jest opatrunkiem w postaci proszku w sprayu do miejscowego stosowania, zawiera kaolin lekki i sulfadiazynę srebra. Kaolin lekki tworzy barierę mechaniczną chroniącą uszkodzoną skórę przed czynnikami zewnętrznymi i jednocześnie odprowadza i wchłania wysięk z rany. Obecność sulfadiazyny srebra, metaloorganicznego związku otrzymanego przez reakcję azotanu srebra z sulfadiazyną, zapobiega zanieczyszczeniu mikrobiologicznemu opatrunku i chroni ranę przed bakteriami egzogennymi. Dzięki unikalnym składnikom **SOFARGEN[®]Spray** umożliwia kontrolowanie wysięku, tworzy warunki ułatwiające naturalny proces gojenia i zapewnia skuteczną ochronę przed penetracją bakterii. Preparat pozostaje w miejscu podania i nie wpływa na rozciąganie brzegów rany. Można go łatwo usunąć przepłukując ranę roztworem soli fizjologicznej.

SKŁAD:

Kaolin lekki 9,7 g,
mikronizowana sulfadiazyna srebra 0,1 g,
hydrofobowa krzemionka koloidalna 0,1 g,
glukonian wapnia jednowodny 0,1 g,
butan (gaz nośny) 70,0 g.

WSKAZANIA:

SOFARGEN[®]Spray przeznaczony do miejscowego leczenia niewielkich urazów skóry takich jak otarcia, zadrapania, skaleczenia, urazy powierzchniowe oraz innych problemów dermatologicznych.

DAWKOWANIE I SPOSÓB STOSOWANIA:

Przed użyciem energicznie wstrząsnąć pojemnikiem przez kilka sekund. Po odpowiednim oczyszczeniu rany, należy skierować dyszę dozownika w kierunku chorego miejsca trzymając pojemnik w pozycji pionowej w odległości około 15 cm od powierzchni poddawanej leczeniu. Następnie zaaplikować równomierną warstwę preparatu **SOFARGEN[®]Spray** na ranę, naciskając dozownik przez kilka sekund. Stosowanie preparatu **SOFARGEN[®]Spray** powinno odbywać się bez przerw aż do czasu całkowitego zagojenia. Przy każdej kolejnej aplikacji należy starannie oczyścić ranę wodą lub roztworem soli fizjologicznej. Proszek zawarty w preparacie **SOFARGEN[®]Spray** ma tendencję do przylegania do rany (z powodu obecności wysięku) lub do zmacerowanej skóry, natomiast ze skóry zdrowej i suchej będzie spontanicznie odpadał. W razie potrzeby po aplikacji **SOFARGEN[®]Spray**, ranę można zabezpieczyć plastrem lub opatrunkiem, w zależności od jej wielkości.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Osoby ze stwierdzoną nadwrażliwością na składniki preparatu nie mogą używać **SOFARGEN[®]Spray**. Nie stosować dłużej niż 4 tygodnie. W przypadku niepełnego wyleczenia lub wystąpienia niepożądanych objawów należy skonsultować się z lekarzem. Chronić twarz podczas spryskiwania górnej części ciała.

ZALECENIA:

Rozpylony proszek pod wpływem światła może ciemnieć ze względu na zawartość jonów srebra. Zjawisko to nie ma wpływu na jego skuteczność i bezpieczeństwo. Nie należy stosować jednocześnie ze środkami dezynfekującym, płynnymi lub stałymi. Po każdej aplikacji zamknąć pojemnik. Stosowanie u kobiet w ciąży i małych dzieci powinno zostać skonsultowane z lekarzem. **SOFARGEN[®]Spray** należy stosować tylko do leczenia niewielkich urazów.

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Może wystąpić przejściowe uczucie pieczenia lub podrażnienie, jednak nie powodują one żadnych następstw, oraz rzadkie miejscowe reakcje uczuleniowe. W razie wystąpienia działań niepożądanych należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

TERMIN WAŻNOŚCI I PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Nie używać preparatu po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu. Data ważności dotyczy produktu nieużywanego i prawidłowo przechowywanego. Pojemnik pod ciśnieniem, łatwopalny. Nie przebijać ani w żaden inny sposób nie manipulować przy pojemniku, nawet po wyczerpaniu produktu. Produkt zawiera łatwopalny gaz pod ciśnieniem: nie używać w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła. Nie przechowywać w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym. Narażanie na temperatury przekraczające 50°C może spowodować wybuch pojemnika. Po zużyciu opakowanie zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie zawiera gazów szkodliwych dla warstwy ozonowej.

OPAKOWANIE:

Proszek w sprayu 10g.

Data ostatniej aktualizacji: czerwiec 2024

Dystrybutor w Polsce:

AVEC Pharma
AVEC Pharma Sp. z o.o.
ul. Beżowa 2, 54-046 Wrocław
www.avecpharma.com

Producent:
SOFAR S.p.A., Via Firenze 40,
20060 Trezzano Rosa (MI), Italy



0373